

Ukázkový vzorový test z předmětu OŠE postupy:

- 1) permanentní močový katétr smí být obvykle zaveden na dobu max:
 - a) 15 dní
 - b) 19 dní
 - c) **21 dní**
 - d) 27 dní
- 2) průměr permanentních močových katétrů je označen číslem. Číslo 1 označuje cévku o průměru:
 - a) 0,2 mm
 - b) **0,3 mm**
 - c) 0,4 mm
 - d) 0,5 mm
- 3) při očištění klyzmatu se pro dospělého pacienta standardně připravuje množství tekutiny:
 - a) 900 – 1100 ml
 - b) **1000 – 1500 ml**
 - c) 1300 – 1800 ml
- 4) magistrality jsou léky:
 - a) **připravené v lékárně**
 - b) hromadné výroby
 - c) připravené magistrem
- 5) kapsle jsou:
 - a) malé disky slisovaného prachu a jsou obalené ztuhlou polevou
 - b) **volná prachová látka, uzavřená v želatinových tobolkách**
 - c) prachy slisované do velkých kotoučků
- 6) Trendelenburgova poloha je poloha:
 - a) v sedě, nebo polosedě
 - b) sed na lůžku se spuštěnými dolními končetinami
 - c) **na zádech nebo na břiše s hlavou níže než DK**
- 7) Glasgowská stupnice hloubky bezvědomí hodnotí:
 - a) **otevření očí, slovní odpověď, motorická odpověď**
 - b) otevření očí, zmatenost pacienta, reakci na bolest
 - c) otevření očí, reakci na bolest, pohyblivost pacienta
 - d) hloubku spánku, slovní odpověď, reakci na oslovení
- 8) definuj správně výrazy:
 - a) tachypnoe – **zrychlené dýchání**
 - b) pustula – **neštovička**
 - c) Kussmaulovo dýchání – **pravidelné hluboké dýchání**
- 9) Pacient ležící na int. odd. s MRSA má být přeložen do domova důchodců
 - a) MRSA je kontraindikací k jeho přeložení do DD
 - b) **MRSA není kontraindikací k překladi do DD a pacient by měl být přeložen co nejdříve to jeho zdr. stav umožní**
 - c) MRSA se musí nejdříve stabilizovat, zaléčit ATB a následně musí být pacient co nejdříve přeložen do DD
- 10) Druhý stupeň klasifikace dekubitů je charakteristický:
 - a) neblednoucím překrvením
 - b) poškozením či nekrózou podkožní tkáně
 - c) **poškozením epidermis a/ nebo dermis**
- 11) periferní žilní kanyla se nechává standardně zavedena:
 - a) 24 – 36 hodin
 - b) 36 – 48 hodin
 - c) 64 – 70 hodin
 - d) **72 – 96 hodin**
 - e) 96 – 103 hodin
- 12) přiřaď k číslům názvy diet
 - a) 7 – **nízkocholesterolová**
 - b) 4 – **s omezením tuku**
 - c) 12 – **strava batolat**
- 13) jak se nazývá test, který se provádí z důvodu zjištění přiměřenosti kolaterálního oběhu a tepenného zásobení ruky
 - a) Aladinův test
 - b) Alonův test
 - c) **Allenův test**
- 14) Uveď správnou hodnotu pH krve
..... **7,36 – 7,44**
- 15) Uveď příklad příčiny hemolytické reakce při podání krevní transfuze
..... **převod inkompatibilní krve (protilátky v krvi příjemce proti erytrocytům dárce)**